

مثلثات



ماهواره ای اولین ماهواره ساخت ایران است که در بهمن ماه ۱۳۸۷ در مدار فضا قرار گرفت در سکن آلا این ماهواره در ۶ کیلومتری سطح زمین قرار دارد و در مدار خودش حول خط استوا حرکت می‌کند. اگر 0° را بین مرکز زمین (نقطه O) تا ماهواره P و دوره دستوری (نقطه قابل دید روی کره زمین) تا این ماهواره بانداو شعاع نزدیک کره زمین 621 کیلومتر باشد

$$\cos \alpha = \frac{6200}{6200 + h}$$

(بر حسب رادیان)

واحدهای اندازه گیری زاویه

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی

نوایع مثلثاتی

درس اول

درس دوم

درس سوم

کارهای تکمیلی
درینگ


واحدهای اندازه‌گیری زاویه

یادآوری

- اگر محیط دایره‌ای را به 2π کمان مساوی تقسیم کنیم، اندازه زاویه مرکزی رویه‌روی هر کدام از این کمان‌ها 1° درجه است. اندازه هر کمان با زاویه مرکزی رویه‌روی آن کمان برحسب درجه برابر است.
- دایره متناظر دایره‌ای است به شعاع واحد که جهت مثبت آن پر خلاف گردش عقربه‌های ساعت است. به این جهت، جهت متناظر می‌گوییم. معمولاً مرکز این دایره مبدأ مختصات است.


شکل مقابل یک دایره متناظر را نمایش می‌دهد که به 24 قسمت مساوی تقسیم شده است. در جاهای خالی زاویه مناسب را روی شکل مشخص کنید.

برای اندازه‌گیری زاویه، واحد دیگری وجود دارد که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.



در فعالیت زیر رابطه بین اندازه زاویه مرکزی رویه‌روی به یک کمان و طول ک

فعالیت




- یک شیء دایره‌ای شکل انتخاب کنید و نخی را دور آن بسازید و سپس باز کنید؛ طول نخ را با خط کش اندازه بگیرید. طول این نخ جه کمی از دایره را مشخص می‌کند؟ با استفاده از این مقدار شعاع دایره را به دست آورید.

طول نخ اندازه محیط دایره را مشخص می‌کند. اگر فرض کنیم اندازه محیط دایره عددی مانند p شده باشد، یعنی پر لین شعاع به صورت مقابل به دست می‌آید:


$$p = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{p}{2\pi}$$

در این قسمت اگر فرض کنیم که $p = 44 \text{ cm}$ برای محاسبه شعاع با فرض $\pi = 22/14$ داریم:

$$44 = 2 \times 22/14 \times r \Rightarrow r = \frac{44}{22/14} \Rightarrow r = 7$$



۱ قطعه نخی را به اندازه شعاع دایره برش دهید و آن را از نقطه A روی محیط آن دایره قرار دهید تا نقطه B حاصل شود (شکل مقابل). اندازه \widehat{AOB} را با نقاله اندازه گیری کنید. این زاویه تقریباً چند درجه است؟ این زاویه تقریباً برابر با 57° است.






۲ دوباره این قطعه نخ را از نقطه B روی محیط دایره قرار دهید تا نقطه C حاصل شود و این کار را ادامه دهید تا نقاط D, E, F, G روی محیط دایره به دست آیند (شکل مقابل). در این حالت درجه ای دارد که $\angle AOB = \angle FOE = \angle DOE = \angle COD = \angle BOC$ درجه است. آیا دو نقطه G و A برحمنطبق می‌شوند؟ خیر! لین دو نقطه بر هم متنطبق نمی‌شوند.

نکته: $\angle GOA = 18^\circ$

به این ترتیب ۶ زاویه مرکزی حاصل می‌شود که طول کمان رویه روی هر یک از آنها با شعاع دایره برابر است. به هر یک از این زاویه‌ها یک رادیان می‌گوییم.


۱ رادیان برابر است با اندازه زاویه مرکزی دایره‌ای که طول کمان رویه روی آن با شعاع آن دایره مساوی است.

در تمام دایره‌های زیر اندازه زاویه مشخص شده ۱ رادیان است. و هر کدام با استفاده از نقاله اندازه زاویه را بر حسب درجه مشخص کنید.



به عبارت دیگر اگر اندازه $\widehat{AOB} = 1$ رادیان باشد، در شکل مقابل داریم:

$$\begin{aligned} OA &= \widehat{AB} \\ OA' &= \widehat{A'B'} \\ OA'' &= \widehat{A''B''} \end{aligned}$$




جدول زیر را کامل کنید.

نکله	طول کمان AB_i , $1 \leq i \leq 7$	اندازه زاویه $\angle AOB_i$, $1 \leq i \leq 7$
۷ رادیان	$5\pi r$	57°
۵ رادیان	$4\pi r$	72°
۴ رادیان	$3\pi r$	90°
۳ رادیان	$2\pi r$	108°
۲ رادیان	πr	126°
۱ رادیان	r	144°

همان طور که می‌بینید در هر ستون با تقسیم طول کمان به شعاع دایره (α)، اندازه زاویه مرکزی مربوط به آن بر حسب رادیان بدست می‌آید.
با توجه به جدول صفحه قبل می‌توان گفت:

$$\frac{\text{طول کمان روبروی زاویه}}{\text{شعاع دایره}} = \text{اندازه یک زاویه بر حسب رادیان}$$



اگر l طول کمان روبروی زاویه، r شعاع دایره و α اندازه زاویه بر حسب رادیان باشد، آنگاه رابطه بالا را به صورت زیر می‌توان نوشت:

$$\alpha = \frac{l}{r}$$

در رابطه بالا l و r هم واحدند.

کار در کلاس

با استفاده از رابطه بالا جدول زیر را کامل کنید:

l	۵ سانتی متر	۱۰ سانتی متر	۲۰ سانتی متر	۵۰ سانتی متر
r	۵ متر	۱۰ متر	۲۰ متر	۵۰ متر
α	۱ رادیان	۲ رادیان	۴ رادیان	۱۰ رادیان

$$r = 5 \text{ cm}, \alpha = ? , \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow 1 = \frac{1}{\frac{r}{\alpha}} \Rightarrow 1 = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow 1 = 5 \text{ cm}$$

$$r = 5 \text{ m}, 1 = 500 \text{ cm} \Rightarrow 1 = 5 \text{ m}, \alpha = ? , \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow \alpha = \frac{5}{5} \Rightarrow \alpha = 1 \text{ رادیان}$$

$$r = 5/5 \text{ m}, \alpha = ? , \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow 1 = \frac{1}{\frac{5}{5}} \Rightarrow 1 = 1/5 \text{ m}$$

$$r = 1 \text{ m}, 1 = 200 \text{ cm} \Rightarrow 1 = 2 \text{ m}, \alpha = ?, \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow \alpha = \frac{2}{1} \Rightarrow \alpha = 2 \text{ رادیان}$$

$$1 = 90 \text{ cm}, \alpha = ? , r = ?, \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow r = \frac{90}{1} \Rightarrow r = 90 \text{ cm}$$

$$r = 10 \text{ m}, 1 = 50 \text{ m}, \alpha = ?, \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow \alpha = \frac{50}{10} \Rightarrow \alpha = 5 \text{ رادیان}$$

$$1 = 10 \text{ m}, \alpha = ? , r = 10, \alpha = ? , \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow 10 = \frac{10}{10} \Rightarrow r = 1 \text{ m}$$

$$r = 20 \text{ cm}, \alpha = ? , \alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow 20 = \frac{1}{20} \Rightarrow l = 400 \text{ cm}$$

۲/۱۴ اسد. حاصل جدول زیر را کامل کنید:

$$\pi \text{ رادیان} = 3/14 \text{ رادیان} \quad 1 \text{ رادیان} = 57^\circ \text{ زاویه بر حسب رادیان}$$

دقتاً 180° تقریباً 179° تقریباً 171° تقریباً 114° تقریباً 57° زاویه بر حسب درجه

$$57^\circ \times 0/5 = 28/5^\circ \quad 57^\circ \times 2 = 114^\circ \quad 57^\circ \times 3 = 171^\circ \quad 57^\circ \times 4/11 = 179^\circ$$

بنابراین، اندازه زاویه مرکزی رو به رو به کمان نیم دایره برابر است با π درجه یا $\pi \cdot 18^\circ$ رادیان. به عبارت دیگر اندازه زاویه تیه صفحه برابر است با π رادیان. در نتیجه:



خواشنده

روز چهاردهم مارس به عنوان روز جهانی عدد بی تام گذاری شده است؛ زیرا اولین سه رقم این عدد تاریخ ۱۴ مارس را به صورت ۳/۱۴ نشان می‌دهد. این تاریخ مصادف با سالروز تولد الیوت لیشنسترن است. تاکنون حدود ۱۳ تریلیون رقم بعد از میلاد عددی محاسبه شده است. با توجه به اهم بودن این عدد و بی‌فاخرده بودن ارقام اعشاری آن امکان یافتن هر نوع عددی از جمله تاریخ تولد، تعداد حساب بانکی، تعداد نفر و ظایر آنها در بین ارقام آن وجود دارد. مثلاً تاریخ تولد مرحوم پروفسور محمود حسایی ۲۱۸۶ است که من تو ان را صورت نمایش ۶ رقمی ۳۸۱۱۲۰ نوشت.
این روش ساده mypiday.com می‌توان
آن را در بین ارقام اعشاری عدد بی بافت.
شکل زیر ارقام عدد بی را تا رسیدن به این نمایش نشان می‌دهد. حال سه از طریق این نمایش ارقام تاریخ و خودتان را در بین ارقام عدد بی باشد.

$$\frac{\pi}{180} \text{ رادیان} = 1 \text{ درجه}$$

بہ این ترتیب:

$$\pi = 180^\circ \text{ راديان}$$

÷ 2 → راديان $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$
÷ 3 → راديان $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$
÷ 4 → راديان $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$
÷ 6 → راديان $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$

کار در کلاس

۱) مطابق نمونه هر یک از زاویه هارا از درجه به رادیان تبدیل کنید:

اگر D اندازه زاویه α پر حسب درجه و R اندازه زاویه α پر حسب رادیان باشد، آنگاه

$$\frac{D}{\lambda \Delta} = \frac{R}{\pi}$$





۱ حال جدول زیر را با استفاده از این رابطه کامل کنید:

(درجه) D	5°	$25/72^\circ$	24°	72°	170°	225°
(رادیان) R	$\frac{\pi}{36}$	$\frac{\pi}{72}$	$\frac{2\pi}{15}$	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{8\pi}{9}$	$\frac{5\pi}{4}$

$$\frac{D}{180^\circ} = \frac{R}{\text{رادیان}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{D}{180^\circ} = \frac{\frac{\pi}{72} \text{ رادیان}}{\frac{\pi}{180}} \Rightarrow D = \frac{180^\circ}{72} \Rightarrow D = 25/72^\circ \\ \frac{24^\circ}{180^\circ} = \frac{R}{\text{رادیان}} \Rightarrow R = \frac{24^\circ}{180^\circ} \cdot \frac{\pi}{\pi} \text{ رادیان} \\ \frac{170^\circ}{180^\circ} = \frac{R}{\text{رادیان}} \Rightarrow R = \frac{170^\circ}{180^\circ} \cdot \frac{\pi}{\pi} \text{ رادیان} \\ \frac{225^\circ}{180^\circ} = \frac{R}{\text{رادیان}} \Rightarrow R = \frac{225^\circ}{180^\circ} \cdot \frac{\pi}{\pi} \text{ رادیان} \end{cases}$$

۲ در شکل زیر در هر یک از جاهای خالی زاویه مناسب را بر حسب رادیان مشخص کنید.





ایستگاه فضایی بین‌المللی را مطابق شکل مقابل در نظر بگیرید که در فاصله تقریبی ۴۰۰ کیلومتری بالای سطح کره زمین قرار دارد. اگر این ایستگاه توسط ایستگاه رمینی از نقطه A تا نقطه B که با مرکز زمین زاویه 45° می‌سازند، رصد شود، این ایستگاه چه مسافتی را در مدار خود از A' به B' پوشش می‌دهد؟ ساعت تقریبی کره زمین را ۶۴۰۰ کیلومتر فرض کنید.

۱ ابتدا زاویه مرکزی 45° را به رادیان تبدیل کنید.

$$\text{رادیان} = \alpha = 45^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ}$$



۲ ساعت مدار دایره‌ای شکل که ایستگاه فضایی روی آن قرار دارد، برابر است با $r = 6800\text{ km}$

$$r = 6400 + 400 = 6800 \text{ km}$$

۳ طول کمان رویه‌روی $A'B'$ با فرض $\pi = 3/14$ و با استفاده از رابطه $\alpha = \frac{l}{r}$ به طور تقریبی برابر است با :


$$A'B' = l = \frac{\pi}{3} \times 6800 \Rightarrow l = \frac{3/14}{3} \times 6800 = 5328 \text{ km}$$

۱ هریک از زاویه‌های -12° , 36° , 72° , 105° , 215° را به رادیان تبدیل کنید و روی دایره متناظر نشان دهید.




۸


$$72^\circ \xrightarrow{\text{رadian} \times \frac{\pi}{180}} \frac{\pi}{5} \text{ رadian}$$



$$-108^\circ \xrightarrow{\text{رadian} \times \frac{\pi}{180}} -\frac{7\pi}{12} \text{ رadian}$$




$$315^\circ \xrightarrow{\text{رadian} \times \frac{\pi}{180}} \frac{7\pi}{4} \text{ رadian}$$




۱ هریک از زاویه‌های $\frac{-\pi}{18}$ رadian، $\frac{-2\pi}{5}$ رadian، $\frac{3\pi}{4}$ رadian، $\frac{7\pi}{8}$ رadian، $\frac{6\pi}{5}$ رadian را به درجه تبدیل کنید و به طور تقریبی روی دایره مثلثاتی نشان دهید.


$$\frac{-\pi}{18} \text{ رadian} \xrightarrow{\pi = 180^\circ} -10^\circ$$




$$\frac{-2\pi}{5} \text{ رadian} \xrightarrow{\pi = 180^\circ} -72^\circ$$




$$\frac{3\pi}{4} \xrightarrow{\text{رادیان}} ۱۳۵^\circ$$



$$\frac{7\pi}{8} \xrightarrow{\text{رادیان}} ۱۵۷.۵^\circ$$



$$\frac{9\pi}{5} \xrightarrow{\text{رادیان}} ۲۱۶^\circ$$



۲) زاویه D بر حسب درجه برابر با $\frac{\pi}{2}$ رادیان است. اندازه این زاویه چند درجه است؟

$$\frac{\pi}{2} \xrightarrow{\text{رادیان}} ۹0^\circ$$

راه اول:

$$\frac{D}{180^\circ} = \frac{\frac{\pi}{2} \text{ رادیان}}{\pi \text{ رادیان}} \Rightarrow D = \frac{180^\circ}{20} \Rightarrow D = ۹^\circ$$

راه دوم:


۳) دایره‌ای به شعاع 1 سانتی‌متر مفروض است. اندازه زاویه مرکزی مقابل به کمانی به طول 8 سانتی‌متر از این دایره چند رادیان است؟

$$\alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow \alpha = \frac{8}{1} \Rightarrow \alpha = ۸ / ۱$$

نکته: l و r هم واحد هستند و α پر حساب رادیان به دست می‌آید.

۵ درستی نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل بررسی کنید.

الف) اگر زاویه بن دو ساق مثلث متساوی الساقین ۱ رادیان باشد، آنگاه اندازه قاعده این مثلث کوچکتر از اندازه هر یک از ساق های آن است.



همانطور که قبلاً دیده ایم ۱ رادیان تقریباً برابر با $57\frac{2}{3}$ درجه است. بنا براین با توجه به اینکه مثلث متساوی الساقین است، بنا براین اندازه هر یک از دو زاویه مجاور به ساق را می توان به دست آورد: $B = C = \frac{180^\circ - 57\frac{2}{3}^\circ}{2} = 61\frac{25}{35}^\circ$. همچنین می دانیم در هر مثلث ضلع رویه رو به زاویه بزرگ تر، بزرگ تر از ضلع رویه رو به زاویه کوچک تر است پس طول قاعده کوچک تر از طول ساق ها خواهد بود. پس عبارت فوق درست است.

ب) در دایره ای به شعاع ۱ سانتی متر طول کمان رو به روی زاویه π رادیان تقریباً برابر با $\frac{3}{14}$ سانتی متر است.

$$\alpha = \frac{l}{r} \Rightarrow l = r\alpha \Rightarrow l = 1 \times \pi = \pi = \frac{3}{14} \text{ cm}$$

این عبارت درست است زیرا:

پ) انتهای کمان زاویه $\frac{6\pi}{5}$ رادیان در ربع دوم دایره مثلثی فرار دارد.

این عبارت نادرست است زیرا:

راه اول: زیرا $\frac{6\pi}{5} = \pi + \frac{\pi}{5}$ بنا براین انتهای کمان این زاویه در ربع سوم قرار دارد: زیرا بیش از π رادیان است.

راه دوم: انتهای کمان زاویه 216° درجه در ربع سوم است.

ت) زاویه های $\frac{2\pi}{3}$ رادیان، $\frac{\pi}{6}$ رادیان، $\frac{7\pi}{36}$ رادیان، زوایایی یک مثلث را تشکل می دهند.

این عبارت نادرست است زیرا:

راه اول: می دانیم که مجموع زاویه های داخلی یک مثلث 180° است پس:

$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} + \frac{7\pi}{36} = 120^\circ + 20^\circ + 25^\circ = 175^\circ < 180^\circ$$

$$180^\circ \rightarrow \text{مقدار رادیان} \frac{\pi}{9} \text{ رادیان} \quad 126^\circ \rightarrow \text{مقدار رادیان} \frac{7\pi}{36} \text{ رادیان}$$

راه دوم: می دانیم مجموع زاویه های داخلی یک مثلث 180° است پس:

$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{9} + \frac{7\pi}{36} = \frac{24\pi + 4\pi + 7\pi}{36} = \frac{35\pi}{36} \text{ رادیان} \quad 175^\circ \rightarrow \text{مقدار رادیان} \frac{6300}{36}^\circ = 180^\circ$$

راه سوم: می دانیم مجموع زاویه های داخلی یک مثلث 180° یا همان π رادیان است پس:

$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{9} + \frac{7\pi}{36} = \frac{24\pi + 4\pi + 7\pi}{36} = \frac{35\pi}{36} < \pi$$

حال شما مقدار تقریبی زاویه‌های زیر را مشابه نمونه با مانسین حساب به دست آورید.

$$\frac{\pi}{5} \text{ رادیان} = 28/5^\circ$$

$$\frac{\pi}{5} \text{ رادیان} = 45/8^\circ$$

$$2 \text{ رادیان} = 114/5^\circ$$

$$3 \text{ رادیان} = 171/5^\circ$$

$$3/14 \text{ رادیان} \approx 179/9^\circ$$

$$\frac{\pi}{3} \text{ رادیان} = 60^\circ$$

$$\frac{\pi}{4} \text{ رادیان} = 45^\circ$$

$$\pi \text{ رادیان} = 180^\circ$$

درس دوم | روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

خواندنی


یک زاویه بر حسب رادیان را با استفاده از مانسین حساب می‌توان به طور تقریبی بر حسب درجه محاسبه کرد. در اغلب مانسین حساب‌ها دکمه‌ای با ناماد π وجود دارد. مثلاً برای محاسبه $1 \times \frac{180}{\pi}$ را بدست اولم کنید. نظریاً برابر با $57\frac{2}{3}$ است.

$$\begin{aligned} 0/5 \times \frac{180}{\pi} &= 28/5^\circ, \quad \frac{\pi}{5} \times \frac{180}{\pi} = 45/8^\circ, \quad 2 \times \frac{180}{\pi} = 114/5^\circ \\ \pi \times \frac{180}{\pi} &= 171/5^\circ, \quad 3/14 \times \frac{180}{\pi} = 179/9^\circ, \quad \frac{\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 60^\circ \\ \frac{\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} &= 45^\circ, \quad \pi \times \frac{180}{\pi} = 180^\circ \end{aligned}$$

درس دوم


روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

در شکل مقابل، یک دایره مثلثاتی با چهار ربع آن مشخص شده است. جدول زیر علامت چهار نسبت مثلثاتی در هر ربع را نشان می‌دهد.








نسبت مثلثاتی	ربع	اول $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	دوم $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$	سوم $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$	چهارم $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$
$\sin \alpha$	+	+	-	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-	-

۱) جداول زیر را مطابق نمونه کامل کنید.



زاویه α	انتهای کمان روبروی α	علامت نسبت مثلثاتی
75°	ربع اول	$\tan \alpha > 0$
15°	ربع دوم	$\sin \alpha > 0$
21°	ربع سوم	$\cos \alpha < 0$
24°	ربع سوم	$\cot \alpha > 0$
285°	ربع چهارم	$\tan \alpha < 0$





زاویه α	انتهای کمان روبروی α	علامت نسبت مثلثاتی
$\frac{3\pi}{4}$ رادیان	ربع دوم	$\cos \alpha < 0$
$\frac{4\pi}{5}$ رادیان	ربع دوم	$\sin \alpha > 0$
$\frac{5\pi}{3}$ رادیان	ربع چهارم	$\tan \alpha < 0$
$\frac{5\pi}{12}$ رادیان	ربع اول	$\cos \alpha > 0$
$\frac{5\pi}{4}$ رادیان	ربع سوم	$\cot \alpha > 0$

بنابراین $\frac{3\pi}{4}$ رادیان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ رادیان بیشتر است پس در ربع دوم قرار دارد. $\frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$

بنابراین $\frac{4\pi}{5}$ رادیان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ رادیان از $\frac{\pi}{2}$ رادیان کمتر است پس در ربع دوم قرار دارد. $\frac{4\pi}{5} = \pi - \frac{\pi}{5}$

بنابراین $\frac{5\pi}{3}$ رادیان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ رادیان از $\frac{3\pi}{2}$ رادیان کمتر است پس در ربع چهارم قرار دارد. $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$

بنابراین $\frac{5\pi}{12}$ رادیان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ رادیان از $\frac{\pi}{2}$ رادیان کمتر است پس در ربع اول قرار دارد. $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$

بنابراین $\frac{5\pi}{4}$ رادیان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ رادیان بیشتر است پس در ربع سوم قرار دارد. $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$

اگر $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$ و انتهای کمان روبروی زاویه α در ربع سوم باشد، محاسبات زیر را کامل کنید:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \quad \cos \alpha < 0 \quad \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} \quad \tan \alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{-2\sqrt{2}}{-1} \quad \cot \alpha = 2\sqrt{2}$$

۲ اگر $\cot \alpha = -2$ و $\cos \alpha > 0$ سایر نسبت‌های مثلثاتی α را بیابید.

حل: چون $\cot \alpha < 0$ لذا انتهای کمان α در ربع چهارم واقع است. بنابراین:

$$\frac{1}{\sin^2 \alpha} = 1 + \cot^2 \alpha = 5 \rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1}{5} \rightarrow \sin \alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}}$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \frac{4}{5} \rightarrow \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \rightarrow \tan \alpha = -\frac{1}{2}$$

کار در کلاس

۱ اگر $\cos x = -\frac{4}{5}$ و $\sin x > 0$ ، نسبت‌های مثلثاتی دیگر زاویه x را بیابید.

حل: چون $\sin x > 0$ لذا انتهای کمان x در ربع دوم واقع است. بنابراین:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \rightarrow \sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} \rightarrow \sin^2 x = \frac{9}{25} \rightarrow \sin x = \frac{3}{5}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \rightarrow \tan x = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} \rightarrow \tan x = -\frac{3}{4}$$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x} \rightarrow \cot x = -\frac{4}{3}$$

۲ جدول زیر را کامل کنید.

زاویه α	0°	$\frac{\pi}{6}$ رادیان	30° رادیان	$\frac{\pi}{4}$ رادیان	45° رادیان	$\frac{\pi}{3}$ رادیان	60° رادیان	$\frac{\pi}{2}$ رادیان	90° رادیان	$\frac{3\pi}{4}$ رادیان	180° رادیان	π رادیان	270° رادیان	$\frac{5\pi}{4}$ رادیان	360° رادیان
$\sin \alpha$	۱	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	۱	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	۰	-۱	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-۱	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	۰	
$\cos \alpha$	۱	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	۰	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-۱	۰	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	۱	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	۱	
$\tan \alpha$	۰	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	۱	$-\sqrt{3}$	undefined	۰	۱	undefined	۰	undefined	۰	undefined	۰	۰	۰
$\cot \alpha$	undefined	$-\sqrt{3}$	۱	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	۰	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	۰	۰	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	undefined	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	undefined	undefined

۷ حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\cot \frac{\pi}{6} - \tan \frac{\pi}{3} \times \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{3} - \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{6}}{2}$$


$$\frac{\tan^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{4})}{\cot^2(\frac{\pi}{4}) - \cos^2(\frac{\pi}{3})} + \cos^2 75^\circ + \sin^2 75^\circ = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} + 1 = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{4}} + 1 = \frac{10}{9} + 1 = \frac{19}{9}$$

در ادامه می‌خواهیم بیتبینیم نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های قرینه، متمم و مکمل با هم چه ارتباطی دارند.

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های قرینه

بررسی

دو زاویه α و $-\alpha$ - را قرینه یکدیگر می‌گویند. اگر در شکل مقابل، $\alpha = 30^\circ$ ، نسبت‌های مثلثاتی زاویه -30° - در $\triangle OP'H$ عبارت‌اند از :



قرینه یک نقطه به مختصات (x, y) نسبت به محور افقی نقطه‌ای به مختصات $(x, -y)$ است.

$$\sin(-30^\circ) = \frac{-y}{r} = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos(-30^\circ) = \frac{x}{r} = \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan(-30^\circ) = \frac{-y}{x} = -\tan(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cot(-30^\circ) = \frac{x}{-y} = -\cot(30^\circ) = -\sqrt{3}$$

در حالت کلی :


$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

۱) سایر نسبت‌های مثلثاتی زاویه $-\frac{\pi}{4}$ را رادیان را مطابق نمونه به دست آورید.



$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan(-\frac{\pi}{4}) = -\tan(\frac{\pi}{4}) = -1$$

$$\cot(-\frac{\pi}{4}) = -\cot(\frac{\pi}{4}) = -1$$

۲) حاصل هریک از عبارت‌های زیر را مطابق نمونه به دست آورید.

$$\cot(-\frac{\pi}{3}) \times \cos(-\frac{\pi}{6}) + \tan(-\frac{\pi}{4}) = -\cot\frac{\pi}{3} \times \cos\frac{\pi}{6} - \tan\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\text{الف} \quad \frac{\cos(-90^\circ) + \sin(-270^\circ)}{\sin(-180^\circ) - \cos(-360^\circ)} = \frac{\cos 90^\circ - \sin 270^\circ}{-\sin 180^\circ - \cos 360^\circ} = \frac{0 - (-1)}{0 - 1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\text{ب) } \cot(-\frac{\pi}{6}) + \tan(-\frac{\pi}{3}) = -\cot(\frac{\pi}{6}) - \tan(\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3} - \sqrt{3} = -2\sqrt{3}$$


$$\text{ب) } \cos(-45^\circ) \times \cos(-60^\circ) + \sin(-45^\circ) \times \sin(-60^\circ) = \cos(45^\circ) \times \cos(60^\circ) + (-\sin(45^\circ)) \times (-\sin(60^\circ))$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های مکمل

فعالیت

دو زاویه α و β را مکمل گوییم؛ هرگاه مجموع آنها 180° یا π رادیان شود. مثلاً دو زاویه 2° و 15° مکمل یکدیگرند. همچنین دو زاویه $\frac{\pi}{3}$ رادیان و $\frac{2\pi}{3}$ رادیان مکمل یکدیگرند (چرا؟). در دایره مثلثاتی زیر اگر $\alpha = 30^\circ$ با توجه به مختصات نقطه "P" و انتهای کمان زاویه 15° که در ربع دوم واقع است، نسبت‌های مثلثاتی زاویه 15° عبارت اند از:



$$\sin 15^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = y = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 15^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -x = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 15^\circ = \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3} = -\tan 30^\circ$$

$$\cot 15^\circ = \frac{\cos 15^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{3} = -\cot 30^\circ$$

قرینه یک نقطه به مختصات (x,y) نسبت به محور عمودی نقطه‌ای به مختصات $(-x,y)$ است.

در حالت کلی:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

کار در کلاس

۷ مکمل هریک از زاویه‌های زیر را مشخص کنید:

الف 75°

$$180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

مکمل زاویه 75° را زاویه 105° است.

ب -25°

$$180^\circ - (-25^\circ) = 205^\circ$$

مکمل زاویه -25° را زاویه 205° است.

$\frac{\pi}{12}$ رادیان (ب)

$$\pi - \frac{\pi}{12} = \frac{11\pi}{12}$$

مکمل زاویه $\frac{\pi}{12}$ رادیان، زاویه $\frac{11\pi}{12}$ رادیان است.

ت $\frac{-\pi}{4}$ رادیان

$$\pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{5\pi}{4}$$

مکمل زاویه $\frac{-\pi}{4}$ رادیان، زاویه $\frac{5\pi}{4}$ رادیان است.

۸


نسبت‌های مثلثی زاویه $\frac{5\pi}{6}$ رادیان را مطابق نمونه به دست آورید.

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \sin(\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos(\pi - \frac{\pi}{6}) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{5\pi}{6} = \tan(\pi - \frac{\pi}{6}) = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cot \frac{5\pi}{6} = \cot(\pi - \frac{\pi}{6}) = -\cot \frac{\pi}{6} = -\sqrt{3}$$



فعالیت

حاصل هریک از نسبت‌های مثلثاتی زیر را مطابق نمونه به دست آورید.

$$\tan \frac{2\pi}{3} = \tan (\pi - \frac{\pi}{3}) = -\tan \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$\cos \frac{3\pi}{4} = \cos (\pi - \frac{\pi}{4}) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cot(-120^\circ) = -\cot(120^\circ) = -\cot(180^\circ - 60^\circ) = -(-\cot 60^\circ) = \sqrt{3}$$

$$\cos(135^\circ) = \cos(180^\circ - 45^\circ) = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$


نسبت‌های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف π را دریابان

فعالیت

نسبت‌های مثلثاتی زاویه 210° را به دست آورید.

انتهای کمان زاویه 210° در ربع سوم واقع است. در ضمن $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ ، یعنی اختلاف دو زاویه 210° و 30° برابر با π رادیان است. در دایره مثلثاتی مقابله، اگر $\alpha = 30^\circ$ آنگاه با

توجه به مختصات نقطه P''' ، نسبت‌های مثلثاتی زاویه 210° عبارت‌اند از:



$$\sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ) = -y = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ) = -x = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 210^\circ = \frac{\sin 210^\circ}{\cos 210^\circ} = \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \tan 30^\circ$$

$$\cot 210^\circ = \frac{1}{\tan 210^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{3} = \cot 30^\circ$$

فرینه‌یک نقطه به مختصات (x, y) نسبت به سه مختصات نقطه‌ای به مختصات $(-x, -y)$ است.

در حالت کلی :

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$


$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$$

کار در کلاس

سایر نسبت‌های مثلثاتی زاویه $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$ را مطابق نمونه مشخص کنید.



$$\sin \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \sin(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \cos(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \tan(\pi + \frac{\pi}{6}) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cot \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \cot(\pi + \frac{\pi}{6}) = \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$$

فعالیت

حاصل هر یک از نسبت‌های مثلثاتی زیر را مطابق نمونه بیاورد.

$$\sin 225^\circ = \sin(180^\circ + 45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

$$\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \cos(\pi + \frac{\pi}{3}) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$


~~$$\sin\left(-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{6}\right) = -\sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -(-\sin\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$$~~

~~$$\cot\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = \cot\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cot\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$~~

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های متمم

فعالیت

دو زاویه α و β را متمم گوییم؛ هرگاه مجموع آنها 90° یا $\frac{\pi}{2}$ رادیان شود. مثلاً دو زاویه 30° و 60° در دایره مثلثاتی مقابل متمم یکدیگرند. در این حالت:



$$\begin{aligned}\sin 30^\circ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \cos 30^\circ &= \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan 30^\circ &= \cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \cot 30^\circ &= \tan 60^\circ = \sqrt{3}\end{aligned}$$

زاویه‌ای معرفی کنید که با متمم خودش برابر باشد. برای چنین زاویه‌ای داریم:

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


$$\tan 45^\circ = \cot 45^\circ = 1$$

$$\tan \frac{\pi}{4} = \cot \frac{\pi}{4} = 1$$

همچنین زاویه $....$ و $\frac{\pi}{2}$ رادیان متمم یکدیگرند؛ بنابراین:

$$\sin \frac{\pi}{2} = \cos 0^\circ = 1$$

$$\tan \frac{\pi}{2} = \cot 0^\circ = \text{undefined}$$



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$$

در حالت کلی:

به عبارت دیگر: اگر دو زاویه α و β متمم باشند (رادیان $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$) آنگاه سینوس کسینوس دیگری و تانژانت یکی با کثائزانت دیگری برابر است. به بیان دیگر:

$$\sin\alpha = \cos\beta \quad , \quad \tan\alpha = \cot\beta$$

$$\cos\alpha = \sin\beta \quad , \quad \cot\alpha = \tan\beta$$


نسبت‌های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف $\frac{\pi}{2}$ رادیان

فعالیت

نسبت‌های مثلثاتی زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان را به دست آورید.

چون انتهای کمان زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان در ربع دوم واقع است، به دو روش می‌توان نسبت‌های مثلثاتی آن را یافت.

روش اول - زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان و $\frac{\pi}{3}$ رادیان مکمل یکدیگرند، یعنی $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$. بنابراین:



$$\sin \frac{2\pi}{3} = \sin(\pi - \frac{\pi}{3}) = \dots \sin \frac{\pi}{3} \dots = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{2\pi}{3} = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$


$$\tan \frac{2\pi}{3} = \tan(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\tan \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$\cot \frac{2\pi}{3} = \cot(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\cot \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

روش دوم - اختلاف دو زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان و $\frac{\pi}{6}$ رادیان برابر با $\frac{\pi}{2}$ رادیان است؛ یعنی

$$\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$$

$$\sin \frac{2\pi}{3} = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{2\pi}{3} = \tan \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = -\cot \frac{\pi}{6} = -\sqrt{3}$$

$$\cot \frac{2\pi}{3} = \cot \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

یا به عبارتی $\frac{2\pi}{3}$ رادیان و $-\frac{\pi}{6}$ متمم هم هستند. با توجه قانون نسبت های مثلثاتی برای دو زاویه متمم داریم:

$$\begin{cases} \sin \frac{2\pi}{3} = \cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6} \\ \cos \frac{2\pi}{3} = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) = -\sin \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tan \frac{2\pi}{3} = \cot \left(-\frac{\pi}{6} \right) = -\cot \frac{\pi}{6} \\ \cot \frac{2\pi}{3} = \tan \left(-\frac{\pi}{6} \right) = -\tan \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

از طرفی با توجه به تساوی $\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$ به جای $\frac{2\pi}{3}$ رادیان مقدار مساوی آن یعنی $\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right)$ رادیان را قرار دهیم.


در حالت کلی:

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = \cos \alpha$$


$$\cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\sin \alpha$$

$$\tan \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\cot \alpha$$

$$\cot \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\tan \alpha$$



کار در کلاس



نسبت‌های متناظری زاویه 125° را به دو روش به دست آورید.


راه اول

$$\sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = \cos(180^\circ - 45^\circ) = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = \tan(180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\cot 135^\circ = \cot(180^\circ - 45^\circ) = -\cot 45^\circ = -1$$



راه دوم

$$\sin 135^\circ = \sin(90^\circ + 45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = \cos(90^\circ + 45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = \tan(90^\circ + 45^\circ) = -\cot 45^\circ = -1$$

$$\cot 135^\circ = \cot(90^\circ + 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

کار در کلاس

به کمک نقاله سوالات زیر را پاسخ دهید:

۱ سینوس کدام دو زاویه برابر است؟

$$(\sin 1^\circ = \sin 17^\circ \text{ مثلاً})$$

می‌دانیم زاویه‌های مکمل دارای سینوس‌های برابر هستند.

$$\sin 2^\circ = \sin 16^\circ, \sin 3^\circ = \sin 15^\circ$$

$$\sin 4^\circ = \sin 14^\circ, \sin 5^\circ = \sin 13^\circ$$

$$\sin 6^\circ = \sin 12^\circ, \sin 7^\circ = \sin 11^\circ$$

$$\sin 8^\circ = \sin 10^\circ$$

بنابراین داریم



۲ اختلاف کدام دو زاویه $\frac{\pi}{2}$ را درجه $= 90^\circ$ می‌شود؟

نسبت‌های مثلثاتی یک نمونه را به دست آورید.

به عنوان مثال می‌توانیم 120° و 30° یا 135° و 45° یا 150° و 60° اشاره کنیم.

به عنوان مثال می‌توانیم تجربت‌های مثلثاتی زاویه 150° را به کمک نسبت‌های مثلثاتی 60° به دست آوریم.

$$\sin 150^\circ = \sin(90^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 150^\circ = \cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^\circ = \tan(90^\circ + 60^\circ) = -\cot 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cot 150^\circ = \cot(90^\circ + 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

۳ آیا دو زاویه می‌توان یافت که دارای کسینوس یکسان باشند؟ چرا؟

خواهش نمی‌توان یافت یا توجه به روابطی که برای زوایا مکمل، متمم و دو زاویه که اختلاف آن‌ها $\frac{\pi}{2}$ (یا 90°) باشد، کسینوس‌ها برابر نیستند.

۴ نسبت‌های مثلثاتی زاویه 180° را از روی مکمل آن بیابید.

مکمل زاویه 180° زاویه 0° است. بنابراین داریم

$$\sin 180^\circ = \sin(180^\circ - 180^\circ) = \sin 0^\circ = 0$$

$$\cos 180^\circ = -\cos 0^\circ = -1$$

$$\tan 180^\circ = -\tan 0^\circ = 0$$

$$\cot 180^\circ = -\cot 0^\circ = \text{تعريف تعدد}$$

۵ نسبت‌های مثلثاتی زاویه 135° را از روی مکمل آن بیابید.

$$\sin 180^\circ = \sin(180^\circ - 135^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


$$\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\cot 135^\circ = -\cot 45^\circ = -1$$

نسبت‌های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل $2k\pi$ رادیان (مضارب زوچ π رادیان)

مثالیت



یادآوری می‌کنیم برای رسم زاویه در دایره مثلثاتی نقطه A در شکل مقابل مبدأ حرکت است. برخی از زوایا از یک دور کامل دایره مثلثاتی یعنی 360° بزرگ‌ترند مانند زاویه 45° .

برای رسم چنین زاویه‌ای ابتدا در جهت مثلثاتی یک دور کامل را طی می‌کنیم؛ سپس ادامه زاویه را که به اندازه 45° است رسم می‌کنیم. در این حالت دو زاویه 45° و -45° را هم انتها می‌نماییم.

دو زاویه α و β را هم انتها گوییم؛ هرگاه اضلاع انتهای آنها برهم منطبق شود (شکل مقابل). اگر دو زاویه هم انتها باشند، اختلاف آنها مضرب زوجی از π رادیان با 180° است. مثلاً زاویه‌های 45° و -45° هم انتها هستند؛ زیرا $360^\circ - 45^\circ = 315^\circ$ (شکل سمت راست) در این حالت نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های 45° و -45° بمسانند. چون انتهای کمان زاویه 45° در ربع اول است، بنابراین:

$$\sin 45^\circ = \sin(360^\circ + 45^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \cos(360^\circ + 45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 45^\circ = \tan(360^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

$$\cot 45^\circ = \cot(360^\circ + 45^\circ) = \cot 45^\circ = 1$$

حال همین بررسی را روی زاویه $\frac{5\pi}{3}$ رادیان انجام دهید؛ چون $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$ بدلاین

دو زاویه $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{5\pi}{3}$ رادیان هم انتها هستند (شکل سمت راست).

چون انتهای کمان زاویه $\frac{5\pi}{3}$ رادیان در ربع چهارم است؛ بنابراین:

$$\sin \frac{5\pi}{3} = \sin(2\pi - \frac{\pi}{3}) = \sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{5\pi}{3} = \cos(2\pi - \frac{\pi}{3}) = \cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{5\pi}{3} = \tan(2\pi - \frac{\pi}{3}) = \tan(-\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3}$$

$$\cot \frac{5\pi}{3} = \cot(2\pi - \frac{\pi}{3}) = \cot(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

در حالت کلی برای هر عدد صحیح k ,

$$\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2k\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\cot(2k\pi + \alpha) = \cot \alpha$$


$$\sin(2k\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(2k\pi - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2k\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(2k\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

کار در کلاس



مطابق نویه هر یک از نسبت های متناظر زاویه های زیر را مشخص کنید. (شکل سمت راست)

$$\sin 75^\circ = \sin(2 \times 36^\circ + 3^\circ) = \sin 3^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan(-215^\circ) = -\tan(215^\circ) = -\tan(36^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

$$1 \quad \cos 30^\circ = \cos(36^\circ - 6^\circ) = \cos 6^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2 \quad \sin 42^\circ = \sin(36^\circ + 6^\circ) = \sin 6^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$3 \quad \tan(-225^\circ) = -\tan(225^\circ) = -\tan(36^\circ - 135^\circ) = -(-\tan 135^\circ) = \tan 135^\circ \\ = \tan(18^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = 1$$



$$4 \quad \cot(-33^\circ) = -\cot(33^\circ) = -\cot(36^\circ - 3^\circ) = -(-\cot 3^\circ) = \cot 3^\circ = \sqrt{2}$$

$$5 \quad \sin \frac{11\pi}{4} = \sin(\pi + \frac{7\pi}{4}) = \sin \frac{7\pi}{4} = \sin(\pi - \frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


$$6 \quad \cos\left(\frac{-7\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\cot(2\pi - \frac{\pi}{4}) = \cos(-\frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

دو زاویه 30° و -6° هم انتها هستند.


دو زاویه 60° و 420° هم انتها هستند.




دو زاویه 30° و 330° هم انتهای هستند.




دو زاویه 225° و 135° هم انتهای هستند.



دو زاویه $-\frac{\pi}{4}$ و $\frac{7\pi}{4}$ هم انتهای هستند.



دو زاویه $\frac{3\pi}{4}$ و $\frac{11\pi}{4}$ هم انتهای هستند.



تمرین

حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به دست آورید:

(الف) $\tan 135^\circ + \cot 115^\circ = \tan(180^\circ - 45^\circ) + \cot(180^\circ - 60^\circ) = -\tan 45^\circ + (-\cot 60^\circ) = -1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

(ب) $\cos(-210^\circ) + \cot(240^\circ) = \cos 210^\circ + \cot 240^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ) + \cot(180^\circ + 60^\circ)$
 $= -\cos 30^\circ + \cot 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3}$

(پ) $\sin 64^\circ + \tan(-56^\circ) = \sin 64^\circ - \tan 56^\circ = \sin(2 \times 36^\circ - 90^\circ) - \tan(36^\circ + 18^\circ)$
 $= -\sin 9^\circ - \tan 18^\circ = -1 + 0 = -1$


(ت) $\cos(-72^\circ) + \cot(-60^\circ) + \tan 72^\circ - \tan(-6^\circ) =$
 $= \cos 72^\circ - \cot 60^\circ + \tan 72^\circ + \tan 60^\circ$
 $= \cos(2 \times 36^\circ + 0) - \cot(2 \times 36^\circ - 12^\circ) + \tan(2 \times 36^\circ + 0) + \tan(2 \times 36^\circ - 12^\circ)$
 $= \cos 0^\circ - (-\cot 12^\circ) + \tan 0^\circ - \tan 12^\circ = \cos 0^\circ + \cot(18^\circ - 6^\circ) + \tan 0^\circ - \tan(18^\circ - 6^\circ)$
 $= \cos 0^\circ - \cot 6^\circ + \tan 0^\circ + \tan 6^\circ = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} + 0 + \sqrt{3} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3}$

$$\text{ث) } \sin\left(\frac{15\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{13\pi}{4}\right) = \sin\left(4\pi + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(4\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\text{ج) } \frac{\sin\frac{3\pi}{4} - \cos\frac{5\pi}{6}}{\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \tan\left(\frac{-4\pi}{3}\right)} = \frac{\sin\frac{3\pi}{4} - \cos\frac{5\pi}{6}}{\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \tan\left(-\frac{4\pi}{3}\right)} = \frac{\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)}{-\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) - \tan\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right)}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-4 - \sqrt{6}}{10}$$

جدول زیر را کامل کنید:



زاویه نسبت	۱۲۰°	۱۳۵°	۱۵۰°	۲۱۰°	۲۲۵°	۲۴۰°	۳۰۰°	۳۳۰°
	sin x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
cos x	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
tan x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	- $\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
cot x	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$

بدون استفاده از ماشین حساب درستی تساوی های زیر را بررسی کنید.

الف) $\sin 184^\circ = \sin 6^\circ$

$$\sin 184^\circ = \sin(2 \times 36^\circ + 120^\circ) = \sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$$

ب) $\cos(-324^\circ) = \cos 36^\circ$

$$\cos(-324^\circ) = \cos 324^\circ = \cos(360^\circ - 36^\circ) = \cos 36^\circ$$

پ) $\tan(-1000^\circ) = \tan 80^\circ$

$$\tan(-1000^\circ) = -\tan 1000^\circ = -\tan(3 \times 360^\circ - 80^\circ) = -(-\tan 80^\circ) = \tan 80^\circ$$

ث) $\sin 1875^\circ = \sin 155^\circ$

$$\sin 1875^\circ = \sin(5 \times 360^\circ + 155^\circ) = \sin 155^\circ$$

راه حل دیگر این است که نشان دهیم این زوایا هم انتها هستند. همانطور که ملاحظه می شود اختلاف هر دو زاویه از زد شده

در هر قسمت مضربی از 2π رادیان یا 360° است:

$$1875^\circ - 155^\circ = 720^\circ = 2 \times 360^\circ$$

۲ در تساوی های زیر به جای x یک زاویه مناسب قرار دهد :

(الف) $\sin x = \cos(20^\circ + x)$

$$x + 20^\circ + x = 90^\circ \Rightarrow x = 35^\circ$$

با توجه به رابطهٔ نوشته شده باید زوایا متمم هم باشند پس داریم :

(ب) $\tan(x + \frac{\pi}{18}) = \cot(\frac{2\pi}{9} + x)$

$$x + \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi}{9} + x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{9}$$

با توجه به رابطهٔ نوشته شده باید زوایا متمم هم باشند پس داریم :

آیا برای زاویه x تنها یک مقدار می‌توان یافت؟ جواب خود را با جواب‌های دوستان خود مقایسه کنید.

با توجه به نسبت های مثلثاتی زاویه های متمم ، می توانیم زوایای فوق را به دست آوریم اما برای یکتاوی پاسخ ارائه شده می توانیم توضیح دهیم که می توان زوایای بسیاری یافت که در تساوی های فوق صدق کنند کافی است مضارب 2π رادیان یا 360° را به این زوایا اضافه کنیم مثلاً برای قسمت (الف) $x = 395^\circ$ یا برای قسمت (ب) $x = \frac{19\pi}{9}$ نیز قابل قبول هستند.

فصل ۴ | مثلثات

درس سوم

توابع مثلثاتی

تابعی نظیر تابع سینوس با ضابطه $x = \sin y$ و تابع کسینوس با ضابطه $x = \cos y$ سوچهای از توابع مثلثاتی اند که در این درس با نمودار آنها آشنا می شوید.

رسم تابع سینوس

فعالیت


۱ جدول رو به رو را کامل کنید.

مجموعه زوج های مرتب حاصل در جدول مقابل یک تابع به صورت زیر مشخص می کند.


$$f = \left\{ (0, 0), \left(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{\pi}{4}, 1\right), \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2}\right), \left(\pi, 0\right) \right\}$$

x	$y = \sin x$	مختصات نقطه
۰	۰	(۰, ۰)
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$
$\frac{\pi}{4}$	۱	$(\frac{\pi}{4}, 1)$
$\frac{\pi}{2}$	۱	$(\frac{\pi}{2}, 1)$
$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2})$
π	۰	(π , ۰)


نقطه حاصل در جدول را در شکل زیر مشخص کنید.



با افزودن نقطه $(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ و $(\frac{3\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ به جدول بالا، شکل زیر به دست می‌آید.
(با فرض $\frac{1}{4} = \frac{1}{7} \sqrt{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{7} \sqrt{3}$)




نقطه حاصل را به ترتیب به یکدیگر وصل می‌کنیم تا شکل مقابل به دست بیاید. با افزودن تعداد نقاط جدول فوق در بازه $[0, \pi]$ این شکل به طور دقیق‌تری به دست می‌آید. شکل حاصل نمودار تابع سینوس با ضابطه $x = y$ را در این بازه مشخص می‌کند.




۵ مراحل صفحه قبل را برای رسم نمودار تابع سینوس در بازه $[2\pi, \pi]$ انجام دهید.

برای این کار ابتدا جدول زیر را کامل کنید؛ سپس نقاط به دست آمده در جدول را در صفحه مختصات مطابق شکل زیر مشخص و آنها را به ترتیب به یکدیگر وصل کنید.

x	$y = \sin x$	مختصات نقطه
π	-1	$(\pi, -1)$
$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$(\frac{7\pi}{6}, -\frac{1}{2})$
$\frac{4\pi}{3}$	-1	$(\frac{4\pi}{3}, -1)$
$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$(\frac{11\pi}{6}, -\frac{1}{2})$
2π	0	$(2\pi, 0)$



۶ با توجه به شکل های فوق، نمودار تابع با ضابطه $y = \sin x$ در بازه $[2\pi, \pi]$ و $[0^\circ, 180^\circ]$ در شکل زیر رسم شده است.
حال با توجه به این شکل جدول زیر را درباره مقدار این تابع در هر بازه تکمیل کنید.



$$\left[0^\circ, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$$

$$\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$$

$$\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$$

مقدار تابع از -1 تا 0 باید افزایش می باید	مقدار تابع از 0 تا 1 کاهش می باید	مقدار تابع از -1 تا 0 باید افزایش می باید	مقدار تابع از 0 تا 1 کاهش می باید
مقدار تابع در پنجم چهارم منفی است.	مقدار تابع در دویم سوم منفی است.	مقدار تابع در پنجم سوم منفی است.	مقدار تابع در اولین منیت است.

۷ با توجه به رابطه $\sin(x+2k\pi) = \sin x$ ، که در درس قبل آشنا شدید می توان گفت:

$$\sin(x+180^\circ) = \sin x$$

يعني مقدار تابع سینوس با اضافه کردن 2π رادیان به کمان آن تغییری نمی کند
بنابراین نمودار تابع سینوس در بازه های $[2\pi, 0^\circ]$ و $[2\pi, 4\pi]$ یکسان است.


$$\sin(x - 2\pi) = \sin x$$

بعنی مقدار تابع سینوس با کم کردن 2π رادیان از کمان آن تغییری نمی‌کند.

در نتیجه نمودار تابع سینوس در بازه‌های $[0^\circ, 360^\circ]$ و $[-360^\circ, 0^\circ]$ بکسان است.

در حالت کلی چون مقدار تابع سینوس با اضافه یا کم کردن مضارب زوج π رادیان به کمان آن تغییر نمی‌کند، نمودار تابع سینوس در بازه‌های $[\pi(2k+2), 2k\pi + \pi]$ و $[-2k\pi - \pi, -\pi]$ بکسان است. به این ترتیب منحنی این تابع که در بازه $[0^\circ, 360^\circ]$ رسم شده در بازه‌های $[-4\pi, 4\pi]$ و $[-2\pi, 2\pi]$ تکرار می‌شود.

در شکل زیر نمودار تابع سینوس در ۲ تکرار رسم شده است. این نمودار را برای ۴ تکرار کامل کنید.



با توجه به شکل بالا جاهای خالی را درباره ویرگوی های تابع سینوس با ضابطه $y = \sin x$ کامل کنید.

الف) دامنه تابع سینوس \mathbb{R} و برد آن $[-1, 1]$ است.

ب) مقدار تابع سینوس در طول های $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, برابر با صفر است.

پ) حداقل مقدار تابع سینوس برابر با -1 است که در نقاطی به طول های $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{5\pi}{2}$, ... داشته باشد.

و در حالت کلی $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, به دست می‌آید.

ت) حداقل مقدار تابع سینوس برابر با 1 است که در نقاطی به طول های $x = \frac{-3\pi}{2}$, $x = \frac{-7\pi}{2}$, ... داشته باشد.

و در حالت کلی $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, به دست می‌آید.


کار در کلاس

هر یک از توابع با ضابطه‌های داده شده دارای کدام نمودار است؟

برای رسم نمودار این تابع در بازه $[-2\pi, 2\pi]$ چون برد تابع بازه $[-2, 2]$ است،


کافی است نمودار تابع یا ضابطه $y = \sin x$ را روی این بازه انبساط دهیم.

نمودار حاصل در بازه $[-2\pi, 2\pi]$ تکرار عی شود. و شکل مقابله به دست می‌آید.




(الف)

۱) $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$




برای رسم تمودار این تابع کافی است تمودار تابع $y = \sin x$ را به اندازه یک واحد در جهت مثبت روی محور عمودی منتقل دهیم.
به این ترتیب شکل مقابل حاصل می شود.

۲) $y = \sin x + 1$



برای رسم تمودار این تابع کافی است تمودار تابع $y = \sin x$ را به اندازه $\frac{\pi}{2}$ واحد در جهت مثبت روی محور افقی منتقل دهیم.
به این ترتیب شکل مقابل حاصل می شود.

۳) $y = -\sin x + 1$



برای رسم تمودار این تابع ابتدا تمودار تابع $y = -\sin x$ را با قریبی کردن تمودار تابع سینوس تسبیت یه محور x ها رسم نموده و سپس تمودار حاصل را به اندازه یک واحد در جهت مثبت محور عمودی منتقل می دهیم به این ترتیب شکل مقابل یه دست می آید.

رسم تابع کسینوس

مثال

۱) جدول زیر را کامل کنید.


به این ترتیب مجموعه زوج های مرتب زیر به دست می آید.

$$f = \{(-\pi, 1), (\frac{\pi}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), (\frac{\pi}{2}, 0), (\frac{3\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}), (\pi, -1)\}$$

آیا این مجموعه یک تابع را مشخص می کند؟


بله یک تابع را مشخص می کند.

x	$y = \cos x$	محصصات نقطه
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = +\sqrt{2}/2$	$(\frac{\pi}{4}, +\sqrt{2}/2)$
$\frac{\pi}{2}$	۰	$(\frac{\pi}{2}, 0)$
$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}/2$	$(\frac{3\pi}{4}, -\sqrt{2}/2)$
π	-۱	$(\pi, -1)$




۱ نقاط جدول بالا را در این شکل مشخص کنید.

۲ نقاط به طول های $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}$ را به جدول بالا اضافه کنید تا شکل زیر به دست آید. ($\sqrt{3} = 1/\sqrt{3}$).




x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$
$y = \cos x$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

۳ نقاط شکل صفحهٔ قبل را به ترتیب به یکدیگر وصل می‌کنیم تا شکل مقابل به دست آید.
این شکل نمودار تابع کسینوس با ضابطه $y = \cos x$ در بازه $[0, \pi]$ مشخص می‌کند.




۴ جدول زیر را کامل کنید تا نمودار تابع کسینوس در بازه $[2\pi, \pi]$ به صورت شکل مقابل به دست آید.




x	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
y	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1

با توجه به مراحل بالا نمودار تابع کسینوس با ضابطه $y = \cos x$ در بازه $[0, 2\pi]$ رسم شده است. با توجه به این شکل جدول زیر را کامل کنید.

 $[0, \frac{\pi}{2}]$ $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$

مقدار تابع از 0 تا 1 باید باشد.	مقدار تابع از -1 تا 0 باید باشد.	مقدار تابع از 0 تا 1 باید باشد.	مقدار تابع در بین دو معرفی است.
مقدار تابع در بین دو معرفی است.	مقدار تابع در بین دو معرفی است.	مقدار تابع در بین دو معرفی است.	مقدار تابع در بین دو معرفی است.

۷ تابع کسینوس دارای نمودار پکسایی در بازه های $[-2\pi, 0]$, $[0, 2\pi]$, $[-4\pi, -2\pi]$, $[2\pi, 4\pi]$ و $[-2\pi, 2\pi]$ است. در شکل زیر نمودار تابع کسینوس در بازه $[-4\pi, 0]$ رسم شده است. شکل را کامل کنید.



۸ با توجه به شکل صفحه قبل جاهای خالی را در خصوص ویژگی های تابع با ضابطه $y = \cos x$ کامل کنید.

الف) دامنه تابع کسینوس R و برد آن $[-1, 1]$ است.


ب) مقدار تابع کسینوس در طول های $x = \frac{k\pi}{2}$ برای $k \in \mathbb{Z}$ با صفر است.

پ) حداقل مقدار تابع کسینوس -1 است که در طول های $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, به دست می آید.


ت) حداقل مقدار تابع کسینوس -1 است که در طول های $x = (2k+1)\pi$ به دست می آید.

کار در کلاس


شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $y = 3\cos x$ را نشان می دهد. به طور مشابه هر یک از توابع با ضابطه های داده شده را در بازه $[0, 2\pi]$ ، با استفاده از نمودار تابع کسینوس رسم کنید.




۱) $y = \cos(x + \frac{\pi}{2})$




۲) $y = \cos x - 1$



۳) $y = 1 - \frac{1}{2} \cos x$



۴) $y = \cos(x - \frac{\pi}{2}) + 1$



تمرین

آیا نمودارهای هر جفت از توابع باضابطه‌های زیر بر هم منطبق‌اند یا خیر؟

۱) $y = \sin x$, $y = \cos(x - \frac{\pi}{2})$

$$y = \cos(x - \frac{\pi}{2}) = \cos(-(\frac{\pi}{2} - x)) = \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$$

بله این دو نمودار بر هم منطبق هستند.

۲) $y = \cos x$, $y = \sin(\frac{\pi}{2} + x)$

$$y = \sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos x$$

بله این دو نمودار بر هم منطبق هستند.

۳) $y = \cos x$, $y = \cos(2\pi - x)$

$$y = \cos(2\pi - x) = \cos x$$

بله این دو نمودار بر هم منطبق هستند.


۴) $y = \sin x$, $y = \sin(5\pi - x)$

$$y = \sin(5\pi - x) = \sin(\pi + \pi - x) = \sin(\pi - x) = \sin x$$


لینه و تابع ترکیبی هم متطابق هستند.

نمودار هر یک از توابع باضایطه های زیر را در دستگاه مختصات در بازه های داده شده رسم کنید.


۱) $y = \frac{1}{2} \sin x$, $[0, 2\pi]$




۲) $y = 2 \cos x + 1$, $[-\pi, \pi]$




۳) $y = 1 - \sin x$, $[-\pi, \pi]$




۴) $y = -1 + \cos x$, $[-\pi, \pi]$





۵) $y = 1 + \sin(x + \frac{\pi}{4})$, $[0, 2\pi]$



۶) $y = \cos(x - \frac{\pi}{2})$, $[\pi, 4\pi]$





۳ با توجه به نمودار توابع سینوس و کسینوس، مشخص کنید هر یک از دو نمودار زیر کدام یک از ضابطه های داده شده را دارند؟ نمودار تابع با سایر ضابطه ها را نیز رسم کنید.




الف) $y = 2 \cos x + 1$

ت) $y = \sin x - 2$




۲) با ذکر دلیل مشخص کنید کدام یک از گزاره‌های زیر درست و کدام نادرست است؟

الف) شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $y = \frac{1}{2} \sin x$ را نشان می‌دهد.



درست است. در نمودار تابع سینوس مقادیر y باید نصف شوند.

ب) شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $y = \cos x - 1$ را نشان می‌دهد.



درست است نمودار تابع کسینوس را به اندازه نصف واحد به موازات محور y به سمت پایین منتقل می‌کنیم.

پ) برای رسم نمودار تابع با ضابطه $y = 1 + \sin x$ کافی است نمودار تابع سینوس را به اندازه یک واحد به موازات محور x ‌ها انتقال دهیم.

ت) برای رسم نمودار تابع با ضابطه $y = -\cos x$ کافی است نمودار تابع کسینوس را نسبت به محور x ‌ها فریته کنیم.

پ) باید به اندازه یک واحد به موازات محور y ‌ها به سمت بالا انتقال باید.

ت) درست است.

